

AKILEN®

Ofloxacin

Tablet salut film

Tiap tablet salut film mengandung:
Ofloksasin 200 mg/400 mg

FARMAKOLOGI

AKILEN® mengandung Ofloksasin, suatu fluorokuinolon dengan spektrum anti bakteri yang luas terhadap bakteri Gram-negatif, Gram-positif dan beberapa bakteri anaerob.

AKILEN® bersifat bakterisid dengan cara menghambat subunit A dari enzim DNA gyrase bakteri, suatu enzim yang berpengaruh terhadap *supercoiling* DNA. Interaksi ini mengakibatkan penghambatan replikasi DNA.

Bakteri Gram-negatif yang sensitif terhadap **AKILEN®** adalah sebagai berikut: *E. coli*, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Providencia, Citrobacter, Serratia, Salmonella, Shigella, *Yersinia enterocolitica*, *Vibrio* species, *Legionella pneumophila*, *Campylobacter jejuni*, *Pseudomonas aeruginosa*, termasuk strain yang resisten terhadap antibakteri yang lain.

Bakteri Gram-positif yang sensitif terhadap **AKILEN®** adalah sebagai berikut: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus faecalis*.

Mycobacterium tuberculosis, *Mycobacteria* tertentu dan *Chlamydia trachomatis* juga sensitif terhadap **AKILEN®**.

AKILEN® peroral memberikan penampilan farmakokinetik yang lebih baik dibandingkan siprofloksasin, termasuk bioavailabilitas yang lebih besar dan waktu paruh yang lebih panjang.

Bioavailabilitas oral **AKILEN®** ± 95%, ikatan dengan protein plasma ± 8% dan waktu paruh antara 5 - 7 jam.

INDIKASI

AKILEN® diindikasikan untuk infeksi berat pada:

- Infeksi saluran kemih.
- Uretritis dan servisitis gonokokal dan non-gonokokal.
- Infeksi saluran pernapasan bagian bawah.
- Infeksi kulit dan jaringan lunak.
- Infeksi kandungan, serta enteritis bakterial.

KONTRA-INDIKASI

1. Hipersensitivitas terhadap Ofloksasin dan derivat kuinolon.
2. Wanita hamil dan menyusui.
3. Anak-anak sebelum masa pubertas.

EFEK SAMPING

Ofloksasin seperti fluorokuinolon umumnya dapat ditoleransi dengan baik dan jarang menyebabkan perlunya pengobatan dihentikan karena timbulnya efek samping yang berat.

Efek samping yang paling sering mempengaruhi saluran pencernaan dan susunan saraf pusat misalnya mual, sakit kepala, pusing dan sukar tidur.

Efek samping lain pada saluran pencernaan termasuk muntah, diare, kurang nafsu makan, sakit perut dan mulut kering.

Reaksi hipersensitif: kulit kemerahan dan pruritus.

Kelainan laboratorium jarang terjadi, sedikit dan reversibel. Hal ini termasuk peningkatan BUN, kadar kreatinin serum, SGOT, SGPT, fosfatase alkali, gamma-GT, bilirubin total, penurunan leukosit, eritrosit, Hb dan trombosit serta kenaikan eosinofil.

PERHATIAN

1. Bila timbul reaksi hipersensitif dan gejala yang menyerupai syok, pengobatan dihentikan.
2. Diberikan dengan hati-hati pada penderita dengan fungsi ginjal menurun, dan sesuaikan dosis terhadap beratnya disfungsi ginjal. Penderita lanjut usia mungkin membutuhkan penurunan dosis, karena biasanya bersihan kreatinin sudah menurun.
3. Hati-hati bila diberikan selama usia subur.
4. Absorpsi di dalam usus akan berkurang bila diberikan bersama-sama dengan antasida yang mengandung aluminium atau magnesium hidroksida. Karena itu diberikan 1 - 2 jam sebelum atau sesudah Ofloksasin.

DOSIS

Dewasa:

- Infeksi saluran kemih: 100 - 400 mg, 2 kali sehari selama 1 - 10 hari. Untuk infeksi berat dan terkomplikasi: 600 mg sehari diberikan selama 20 hari.
- Infeksi saluran pernapasan: 200 - 400 mg, 2 kali sehari.
- Uretritis gonokokal dan servisitis yang tidak terkomplikasi (termasuk infeksi PPNG): 200 - 600 mg sebagai dosis tunggal.
- Uretritis non-gonokokal: 400 mg sehari dosis tunggal atau dosis terbagi selama 9 hari.
- Infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi kandungan, serta enteritis bakterial: 400 mg sehari, selama 7 hari.

Untuk penderita dengan penurunan fungsi ginjal, interval pemberian dosis diperpanjang menjadi 24 jam bila bersihan kreatinin antara 20 - 80 ml/menit, dan diperpanjang menjadi 36 sampai 48 jam bila bersihan kreatinin kurang dari 20 ml/menit.

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

KEMASAN

AKILEN® 200: Dus isi 3 strip @ 10 tablet.
No. Reg.: DKL9222213017A1

AKILEN® 400: Dus isi 5 strip @ 6 tablet.
No. Reg.: DKL9522213017B1

PENYIMPANAN

Simpan pada suhu kamar (25° - 30°C).

Dibuat oleh: **PT SANBE FARMA**
Bandung - Indonesia

