

ALLORIS®

Loratadine

Tablet

Each tablet contains:
Loratadine 10 mg

PHARMACOLOGY

ALLORIS® is a new, long-acting antihistamine with selective peripheral H₁ receptor antagonistic activity and no central sedative or anticholinergic effects.

ALLORIS® does not appear to cross the blood-brain barrier and do not usually impair coordination or have other effects on the central nervous system in most patients.

ALLORIS® is rapidly and well absorbed, and peak serum concentrations occur one to two hours after an oral dose.

It has a relatively long elimination half-life (8 to 11 hours), and a single daily dose provides an adequate plasma serum concentration.

About 60% of a dose of Loratadine is eliminated in the faeces and most of the remainder is recovered in the urine.

ALLORIS® as non-sedating antihistamine is the drug of choice for patients who cannot tolerate the central nervous system effects of the traditional antihistamines.

INDICATIONS

ALLORIS® is indicated for the relief of symptoms associated with allergic rhinitis, such as sneezing, nasal discharge and itching as well as ocular itching and burning.

ALLORIS® is also indicated for the relief of the symptoms associated with chronic urticaria and other allergic dermatologic disorders.

CONTRA-INDICATIONS

Hypersensitivity to Loratadine.

ADVERSE REACTIONS

Fatigue, nausea and headache were reported rarely.

PRECAUTIONS

- Loratadine should be administered during pregnancy, since there is no experience of the use of Loratadine in pregnant women.

- Since Loratadine is excreted in breast milk it should not be administered to lactating women.

- Safety and efficacy of Loratadine in children under 12 years of age has not yet been established.

- Studies to establish safety and efficacy in the elderly patients are not yet completed.

DRUG INTERACTIONS

When administered concurrently with alcohol, **ALLORIS®** have no potentiating effects as measured by psychomotor performance studies.

DOSAGES

Adults and children 12 years: 1 tablet daily.

ON MEDICAL PRESCRIPTION ONLY

PRESENTATIONS

Box of 10 strips @ 10 tablets.

Reg. No.: DKL9322214710A1

STORAGE

Store at room temperature (25°- 30°C).

Manufactured by: **PT SANBE FARMA**
Bandung - Indonesia

BF 100 - 3

ALLORIS®

Loratadine

Tablet

Tiap tablet mengandung:
Loratadin 10 mg

FARMAKOLOGI

ALLORIS® adalah antihistamin baru yang mempunyai kemampuan kerja lama dengan daya antagonis selektif pada reseptor H₁ perifer dan tidak menimbulkan efek sedasi atau antikolinergik.

ALLORIS® tidak dapat melalui sawar darah otak dan biasanya tidak mengurangi koordinasi atau menimbulkan pengaruh lain terhadap susunan saraf pusat pada sebagian besar penderita.

ALLORIS® diabsorpsi dengan cepat dan baik, kadar puncak dalam serum dicapai dalam waktu 1 sampai 2 jam setelah pemberian dosis oral.

Waktu paruh eliminasi relatif panjang (8 sampai 11 jam) dan dosis tunggal per hari memberikan kadar serum plasma yang cukup.

Kira-kira 60% dosis Loratadin diekskresikan ke dalam feses, selebihnya ditemukan di dalam urin.

ALLORIS® sebagai antihistamin non sedatif adalah obat pilihan pertama untuk penderita yang tidak tahan terhadap pengaruh obat antihistamin tradisional pada susunan saraf pusat.

INDIKASI

ALLORIS® diindikasikan untuk menyembuhkan gejala-gejala yang berhubungan dengan rinitis alergi seperti: bersin-bersin, pilek dan rasa gatal pada hidung, juga rasa gatal serta rasa terbakar pada mata.

ALLORIS® juga diindikasikan untuk menyembuhkan gejala-gejala yang berhubungan dengan urtikaria kronik dan gangguan lain pada kulit karena alergi.

KONTRA-INDIKASI

Hipersensitivitas terhadap Loratadin.

EFEK SAMPING

Lelah, mual dan sakit kepala jarang terjadi.

PERHATIAN

- Loratadin sebaiknya tidak diberikan selama kehamilan, karena belum ada pengalaman pemakaian pada wanita hamil.

- Oleh karena Loratadin diekskresikan ke dalam air susu, maka sebaiknya tidak diberikan pada wanita yang sedang menyusui.

- Keamanan dan efektivitas Loratadin pada anak-anak di bawah umur 12 tahun belum dapat ditentukan.

- Penelitian untuk menentukan keamanan dan efektivitas pada penderita lanjut usia belum lengkap.

INTERAKSI OBAT

Bila digunakan bersama-sama dengan alkohol, **ALLORIS®** tidak memberikan efek potensiasi seperti yang terukur pada penelitian penampilan psikomotor.

DOSIS

Dewasa dan anak-anak 12 tahun: 1 tablet sehari.

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

KEMASAN

Dus isi 10 strip @ 10 tablet.

No. Reg.: DKL9322214710A1

PENYIMPANAN

Simpan pada suhu kamar (25°- 30°C).

Dibuat oleh: **PT SANBE FARMA**
Bandung - Indonesia

BF 100 - 3