

CERINI[®]

Cetirizine HCl

Kaplet salut film

Tiap kaplet salut film mengandung:
Setirizin Hidroklorida 10 mg

FARMAKOLOGI

Setirizin merupakan antihistamin kuat golongan antagonis H₁ (AH₁) yang tidak menimbulkan efek antikolinergik dan antiserotonin.

Pada dosis farmakologi, hanya sedikit menimbulkan efek mengantuk.

Setirizin menghambat mediator histamin, pada fase cepat reaksi alergi, juga mengurangi perpindahan sel-sel inflamasi dan pelepasan mediator-mediator pada fase lambat reaksi alergi.

INDIKASI

CERINI[®] diindikasikan untuk pengobatan rinitis *perennial*, rinitis alergi, urtikaria idiosinkronis.

KONTRA-INDIKASI

- Hipersensitivitas terhadap Setirizin.
- Ibu menyusui.

EFEK SAMPING

Efek samping Setirizin dapat ditoleransi dengan baik, efek samping yang mungkin terjadi yaitu:

- Perasaan mengantuk, pusing-pusing, sakit kepala, gelisah, mulut kering dan gangguan saluran pencernaan.
- Jika diperlukan pemberian dapat dilakukan dengan dosis 5 mg pada pagi hari dan 5 mg pada sore/malam hari.
- Pada beberapa individu dapat terjadi reaksi hipersensitif termasuk reaksi pada kulit dan angioedema.

PERHATIAN

- Pemakaian tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan apabila mengemudi atau mengoperasikan mesin.
- Hati-hati bila diberikan pada wanita hamil.

INTERAKSI OBAT

Hati-hati bila digunakan bersama-sama dengan sedatif dan alkohol.

DOSIS

Dewasa dan anak-anak usia > 6 tahun:

1 kaplet (10 mg) 1 kali sehari.

- Keamanan penggunaan pada anak-anak usia < 2 tahun belum ditetapkan.
- Belum ada data yang mendukung penurunan dosis pada penderita lanjut usia.
- Pada penderita gangguan fungsi ginjal, dosis dapat diberikan ½ kaplet 1 kali sehari.

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

KEMASAN

Dus isi 2 strip @ 10 kaplet
No. Reg.: DKL982225309A1

PENYIMPANAN

Simpan pada suhu kamar (25° - 30°C).

Dibuat oleh: **PT SANBE FARMA**
Bandung - Indonesia

* BF 261 - 2

CERINI[®]

Cetirizine HCl

Film-coated caplet

Each film-coated caplet contains:
Cetirizine Hydrochloride 10 mg

PHARMACOLOGY

Cetirizine is a potent antihistamine and selective H₁ antagonist (AH₁) with negligible anticholinergic and antiserotonin effects.

It has a low potential for drowsiness at pharmacologically active doses.

Cetirizine inhibits the histamine-mediated "early" phase of the allergic reaction and also reduces the migration of inflammatory cells and the release of mediators associated with the "late" allergic response.

INDICATIONS

CERINI[®] is indicated for the treatment of perennial rhinitis, seasonal allergic rhinitis and chronic idiopathic urticaria.

CONTRA-INDICATIONS

- Hypersensitivity to Cetirizine.
- Nursing mothers.

ADVERSE REACTIONS

Cetirizine is generally well tolerated, the possibility adverse reactions may occur as follows:

- Drowsiness, dizziness, headaches, agitation, dry mouth and gastrointestinal discomfort.
- If affected the dose may be taken as 5 mg in the morning and 5 mg in the evening.
- In some individuals, hypersensitivity reactions, including skin reactions and angioedema may develop.

PRECAUTIONS

- Patients are advised not to exceed the recommended dose if driving or operating machinery.
- It should be used with caution in pregnancy women.

DRUG INTERACTIONS

It should be used with caution in concomitant with sedative and alcohol.

DOSAGES

Adults and children > 6 years of age:

1 caplet (10 mg) daily.

- Safety for use in children < 2 years of age has not been established.
- There are no data to suggest that the dose needs to be reduced in elderly patients.
- In patients with renal insufficiency dosage should be given ½ caplet daily.

ON MEDICAL PRESCRIPTION ONLY

PRESENTATIONS

Box of 2 strips @ 10 caplets
Reg. No.: DKL982225309A1

STORAGE

Store at room temperature (25° - 30°C).

Manufactured by: **PT SANBE FARMA**
Bandung - Indonesia

* BF 261 - 2